

## Cápsulas

Industria francesa

Venta libre

## LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

### ¿QUÉ CONTIENE FLORATIL?

Cada cápsula contiene *Saccharomyces boulardii* 200,00 mg, excipientes (lactosa, estearato de magnesio) cs.

### ACCIÓN/ES

FLORATIL tiene acción como antidiarréico. El principio activo del Floratil, *Saccharomyces boulardii*, actúa en el tracto digestivo restaurando el equilibrio del ecosistema intestinal.

### ¿PARA QUÉ SE USA FLORATIL?

Este medicamento es útil para el tratamiento de las diarreas agudas.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR FLORATIL?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes o es intolerante a la lactosa.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de tomar este medicamento tenga en cuenta los siguientes cuidados:

- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.
- No debe utilizar FLORATIL si está ingiriendo medicamentos por vía oral para el tratamiento de alguna infección por hongos.
- Si usted observa sangre, moco o pus en la materia fecal debe consultar al médico antes de tomar FLORATIL.
- Si la diarrea es muy abundante y frecuente o usted no puede asegurarse una adecuada hidratación debe consultar a su médico antes de tomar FLORATIL.
- Si además de la diarrea presenta fiebre debe consultar a su médico antes de utilizar FLORATIL.
- Si además de la diarrea presenta dolor abdominal debe consultar a su médico antes de utilizar FLORATIL.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Mientras toma este medicamento tenga en cuenta los siguientes cuidados:

- Debe asegurarse una adecuada rehidratación.
- Si durante el cuadro de diarrea aparece moco, sangre o pus en la materia fecal debe consultar a su médico.
- Si durante el cuadro de diarrea no puede hidratarse adecuadamente debe consultar a su médico.
- Si durante el cuadro de diarrea presenta fiebre debe consultar a su médico.
- Si la diarrea persiste por más de 5 días, debe consultar a su médico.
- Si durante el cuadro de diarrea presenta dolor abdominal debe consultar a su médico.
- Floratil está constituido por levaduras; por lo tanto, no deberá agregarse a bebidas o alimentos cuya temperatura supere los 50° C.

### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir con un poco de líquido. Puede administrarse en cualquier momento; no obstante, para obtener una acción más rápida, administrar el medicamento antes de las comidas.



- Tratamiento de ataque: el 1º día 2 cápsulas (1 por la mañana y otra por la noche).
- Tratamiento de mantenimiento: los días siguientes, 1 cápsula por día hasta la desaparición de los síntomas.

Puede administrarse a lactantes, niños y adultos, siendo la misma dosis.

En personas con dificultades para la ingestión de cápsulas (niños o ancianos), se sugiere abrir las cápsulas y diluir el contenido en un poco de agua, otra bebida o verterlo sobre las comidas, de acuerdo a la posología indicada.

FLORATIL no debe mezclarse con líquidos muy fríos ni muy calientes (más de 50° C).

En caso de vomitar durante la hora posterior a una toma, repetir la misma.

### **¿QUÉ EFECTOS NO DESEADOS PUEDO TENER CON EL USO DE FLORATIL?**

Hasta la fecha no se ha constatado ningún efecto secundario indeseable.

### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Ante una sobredosis accidental, suspenda el medicamento y vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a los Centros de Intoxicaciones:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011)4962-6666/9247

Hospital Alejandro Posadas: (011)4654-6648/4658-7777

### **¿CÓMO DEBO CONSERVARLO?**

Conservar a temperatura entre 10 y 25°C, en lugar seco y en su envase original.

### **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Ante cualquier pregunta o duda puede comunicarse con el Laboratorio al 0800-321-2368 o a ANMAT Responde: 0800-333-1234

### **PRESENTACIONES**

Envases conteniendo 10 cápsulas en blisters.

**Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado n° 39.046.

Elaborado por Biocodex, Francia, representado en Argentina por Laboratorios Temis Lostaló S.A.

Importado y distribuido por Laboratorios Temis Lostaló S.A., Zepita 3178, (C1285ABF), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.

**Fecha de la última revisión: 28/Agosto/2014**

39580/01